



Preparación intestinal preoperatoria

Compra en cualquiera farmacia

1. 1 frasco de X-Prep suspensión
2. 1 enema fleet

Día 1. (Día anterior a la cirugía)

Dieta.- consumir liquido como agua, jugos, gelatina, gatorade, café, te, sprite, jugo de Manzana, cranberry, refresco de dieta. Puede endulzar con sustituto de azúcar.
No vino ni productos lácteos.

Medicamentos.- tomar el frasco de X-Prep en la mañana a las 10 AM. Es muy importante que tome todo el frasco.

Ponga el enema 2 veces, la primera vez entre las 3 a 4 de la tarde, 15 min después llene el frasco con agua tibia de la llave y vuelva aplicar.

Día 2 (Día de la cirugía)

Este es su día de la cirugía. No consuma nada por la boca ni siquiera agua desde las 10 de la noche de un día anterior hasta después de la cirugía cuando el doctor le indica.

Si esta tomando algún medicamento puede seguir tomando aunque su intestino esta preparado para la cirugía. Si hay que tomar algún medicamento el día de la cirugía en la mañana tómese con un sorbito de agua.

Si esta tomando algún medicamento que contiene aspirina, suspéndelo 10 días antes de la cirugía. Como quiera coménte con su medico los medicamentos que esta tomando, y el le puede aclarar sus dudas.

En caso de cefalea o dolor de cabeza, paracetamol o Tylenol se pueden tomar.